
ERRATA

Página	Parágrafo	Linha	Onde se Lê	Leia-se
10	T	1	osteoartrose	osteoartrose
12	1	21	decrease	increase
25	1	2	após a menopausa.	após a menopausa induzida pela ooforectomia.
28	2	10	matrix	matriz
37	2	1	análise da espessura das camadas	análise da espessura das zonas
37	2	3	volumes dos núcleos da cartilagem articular	volumes dos núcleos dos condrócitos da cartilagem articular
37	3	2	fora	foram
39	2	4	Foram contados os núcleos	Utilizando objetiva de 10X, foram contados os núcleos
39	2	5	2 campos no cõndilo, medial	2 campos no cõndilo medial
39	3	1	Foram feitas medidas	Utilizando objetiva de 40X, foram feitas medidas
40	1	6	referência será obtido	referência foi obtido
40	1	7	colágenas será registrado	colágenas foi registrado
40	1	7	a seguinte equação será utilizada	a seguinte equação foi utilizada
42	2	1	ANOVA ara	ANOVA para
42	2	7	quantidade de matriz e condrócitos	quantidade de matriz e colágeno
60	Legenda da tabela	1	** Significante em relação ao GOS	** Significante em relação ao GC
60	Legenda da tabela	2	*** Significante em relação ao GOS	*** Significante em relação ao GC
71	1	15	correlação	relação
72	4	1	O exercício não impediu a s alterações	O exercício não impediu as alterações
72	4	2	volume nuclear dos condrócitos nos animais do GOT (29%)	volume nuclear dos condrócitos da zona média, referente aos valores bicondilares nos animais do GOT (29%)
76	7	Todo parágrafo	A deprivação de estrógenos produziu uma diminuição do volume dos núcleos dos condrócitos das zonas superficial e média da cartilagem articular dos cõndilos lateral e medial. O exercício também não influenciou este dado.	A deprivação de estrógenos produziu diminuição do volume dos núcleos dos condrócitos da zona superficial da cartilagem articular quando se consideram os dois cõndilos em conjunto. O mesmo ocorreu na zona média. O exercício mais a deprivação de estrógenos não influenciaram este dado, considerando cada cõndilo isoladamente. Entretanto, os valores bicondilares mostram que estes fatores produziram diminuição do volume dos núcleos dos condrócitos da zona média.
76	8	Todo parágrafo	A ooforectomia não produziu efeito no volume nuclear dos condrócitos da cartilagem. Porém o exercício provocou uma diminuição do volume nuclear dos condrócitos da zona profunda da cartilagem articular do cõndilo lateral da tibia.	A deprivação de estrógenos isoladamente não produziu efeito no volume nuclear dos condrócitos da zona profunda da cartilagem articular. Porém, o exercício mais a deprivação de estrógenos provocaram uma diminuição do volume nuclear dos condrócitos desta zona do cõndilo lateral da tibia.
