



Localização da região da pesquisa



■ Localização do sítio mais setentrional e do sítio mais meridional na região estudada



Subgrupo	Formação	Litologia
Três Marias		Arcóseos cinza a cinza-esverdeado, em bancos, com lentes de siltitos esverdeados
		Siltitos esverdeados com lentes de margas
Paraopeba	Serra da Saudade	Ardósia, siltitos, argilitos, folhelhos localmente oolíticos Cacários e margas na forma de lentes
	Lagoa do Jacaré-Nhandutiba	Calcários pretos a cinza em bancos, localmente oolíticos Folhelhos, siltitos e margas na forma de lentes
	Santa Helena	Folhelhos esverdeados, siltitos e argilitos laminados, margas e ardósias Calcários cinza escuros em forma de lentes
	Sete Lagoas-Januária/Itacarambi	Dolomito cinza com estromatólitos ----- Descontinuidade Dolomitos cristalinos róseos Calcários cinza, preto, bege, etc. Folhelhos, siltitos, argilitos e margas ocorrendo em lentes Calcários oolíticos Brechas laminares Calcários laminares, avermelhados, argilosos, com níveis dolomíticos

Prancha 1 - Mapa de localização regional e coluna estratigráfica do Gupo Bambuí

Coluna estratigráfica composta e simplificada do Grupo Bambuí, de acordo com Projeto RADAMBRASIL, 1982.